



Recueil d'urine pour un compte d'addis

3 heures avant le lever habituel

3 ساعات قبل وقت الإستيقاظ المعتاد

1

Vider la totalité de la vessie dans les toilettes
أفرغ المثانة بأكملها في المراحيض



2

Boire un grand verre d'eau (1/4 de litre d'eau)
أشرب كوب كبير من الماء (1/4 لتر من الماء)



3

Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.
العودة إلى السرير والاستلقاء لمدة 3 ساعات




3 heures après

بعد 3 ساعات

4

Faire une toilette génitale soignée au savon
نظف المنطقة الحميمة باستخدام المطهر



5

Uriner complètement, en recueillant la totalité des urines dans le flacon
remis par le laboratoire
تبول ، واجمع كل البول في القارورة التي يقدمها المختبر



6

Coller l'étiquette code à barre fourni par le laboratoire sur le flacon
ألصق الملصق التعريفي المقدم من طرف المختبر على القارورة



7

Apporter le prélèvement au plus vite au laboratoire
اجلب العينة للمختبر في أقرب وقت ممكن



Recueil d'urine pour un compte d'addis

3 heures avant le lever habituel

3 ساعات قبل وقت الإستيقاظ المعتاد

1

Vider la totalité de la vessie dans les toilettes
أفرغ المثانة بأكملها في المراحيض



2

Boire un grand verre d'eau (1/4 de litre d'eau)
أشرب كوب كبير من الماء (1/4 لتر من الماء)



3

Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.
العودة إلى السرير والاستلقاء لمدة 3 ساعات



3 heures après

بعد 3 ساعات

4

Faire une toilette génitale soignée au savon
نظف المنطقة الحميمة باستخدام المطهر



5

Uriner complètement, en recueillant la totalité des urines dans le flacon
remis par le laboratoire
تبول ، واجمع كل البول في القارورة التي يقدمها المختبر



6

Coller l'étiquette code à barre fourni par le laboratoire sur le flacon
ألصق الملصق التعريفي المقدم من طرف المختبر على القارورة



7

Apporter le prélèvement au plus vite au laboratoire
اجلب العينة للمختبر في أقرب وقت ممكن



Recueil de prélèvement pour ECU

Recueil de prélèvement pour ECU


1 Laver les mains avec soin puis effectuer une toilette intime à l'aide d'antiseptique

إغسل يديك بعناية ثم نظف المنطقة الحميمة باستخدام مطهر



1 Laver les mains avec soin puis effectuer une toilette intime à l'aide d'antiseptique

إغسل يديك بعناية ثم نظف المنطقة الحميمة باستخدام مطهر




2 Ouvrir le pot de recueil et poser le couvercle vers le haut

افتح وعاء الجمع وضع الغطاء على ظهره




2 Ouvrir le pot de recueil et poser le couvercle vers le haut

افتح وعاء الجمع وضع الغطاء على ظهره




3 Éliminer le premier jet d'urine dans les toilettes puis recueillir l'urine dans le pot

أزل التيار الأول من البول في المرحاض ومن ثم إجمع البول في الوعاء




3 Éliminer le premier jet d'urine dans les toilettes puis recueillir l'urine dans le pot

أزل التيار الأول من البول في المرحاض ومن ثم إجمع البول في الوعاء




4 Refermer soigneusement le pot et coller le code à barre fourni par le laboratoire sur le flacon

اغلق الوعاء بعناية و ألق المصق التعريفي المقدم من طرف المختبر على القارورة



4 Refermer soigneusement le pot et coller le code à barre fourni par le laboratoire sur le flacon

اغلق الوعاء بعناية و ألق المصق التعريفي المقدم من طرف المختبر على القارورة



5 Apporter le prélèvement au plus vite au laboratoire (pas plus de 1 heure à température ambiante et 30 min pendant l'été)


اجلب العينة للمختبر في أقرب وقت ممكن (لا يزيد عن 1 ساعة في درجة حرارة الغرفة و 30 دقيقة خلال فصل الصيف)



→ LABO

5 Apporter le prélèvement au plus vite au laboratoire (pas plus de 1 heure à température ambiante et 30 min pendant l'été)

اجلب العينة للمختبر في أقرب وقت ممكن (لا يزيد عن 1 ساعة في درجة حرارة الغرفة و 30 دقيقة خلال فصل الصيف)



→ LABO